

Preparazione esame di Risonanza Magnetica

CON MEZZO DI CONTRASTO

PREPARAZIONE

Il paziente deve presentarsi il giorno dell'esame a **digiuno da almeno 6 ore** e con il risultato recente del dosaggio della **CREATININEMIA** e possibilmente con il calcolo del filtrato glomerulare (**massimo 2 mesi precedenti** la data di esecuzione dell'esame **o con il modulo di rilevazione anamnestica e consenso al mezzo di contrasto compilato e firmato**). È consentito assumere l'abituale terapia domiciliare secondo l'indicazione del proprio Medico Curante con acqua, ma occorre **smettere di bere 1 ora prima** dell'esecuzione dell'esame. Presentarsi all'esame senza piercing, orecchini. Si raccomanda di portare tutta la documentazione clinica e radiologica in possesso.

CONTROINDICAZIONI

Per presenza di elementi all'interno del corpo: pace-maker, neurostimolatore, pompa ad infusione, schegge metalliche, pallini da caccia, corpi estranei metallici, anamnesi di esposizione professionale a metalli, fratture trattate con mezzi di sintesi metallici, protesi (anca, ginocchio, spalla, gomito, apparato urogenitale...), protesi acustiche interne fisse, impianti cocleari, protesi ossiccolari, cristallino artificiale, clips metalliche inserite in seguito a interventi chirurgici (es. interventi in videolaparoscopia, interventi su cuore, addome...).

Stato di gravidanza.

Presenza di allergie.

In caso di presenza di una controindicazione o in caso di dubbi contattare il proprio Medico Curante o chiamare in struttura.

Nota bene

È sconsigliata la RM con mezzo di contrasto nei pazienti con filtrato glomerulare <30ml/min; per informazioni dettagliate contattare la struttura per valutare l'esecuzione dell'esame.

Se è stato somministrato mezzo di contrasto è sconsigliato sottoporsi nelle 48 ore successive e nei 7 giorni successivi ad un'altra indagine con analogo mezzo di contrasto. In presenza di una controindicazione o in caso di dubbi contattare il proprio medico curante. **IN CASO DI ALLERGIE NOTE O PREGRESSE AL MEZZO DI CONTRASTO, GRAVI ALLERGIE A FARMACI O SOSTANZE, IN PRESENZA DI INSUFFICIENZA RENALE CRONICA** il Medico Curante dovrebbe considerare prioritariamente indagini diagnostiche alternative che non prevedano somministrazione di mezzi di contrasto; se invece è necessario il mezzo di contrasto, si devono ritirare c/o radiologia alcune note specifiche da presentare al curante.